




nervatura centrale con peli bianchi nella pagina inferiore

frutti alati penduli in densi grappoli

Frassino Comune *Fraxinus excelsior*

Boschi (formazione mesofile)

Alto fino a 40m | Foglie oblunghhe verde scuro | Corteccia liscia color grigio pallido



Sicamoro (Acero di Monte) *Acer pseudoplatanus*

Boschi (formazione mesofila)


Alto fino a 30m | Foglie palmate verde scuro / blu-grigie | Corteccia rosata / giallo-grigia, si sfalda



Tiglio dalle foglie Grandi *Tilia platyphyllos*

Boschi (formazione mesofila)


Alto fino a 30m | Foglie rotonde e cuoriformi, verde scuro / pallide | Corteccia grigia, fessure superficiali



Faggio Comune *Fagus sylvatica*

Boschi (formazione mesofila)


Alto fino a 40m | Foglie ovate, margine ondulado, verde scuro / verde pallido | Corteccia grigia e liscia



Carpino Nero *Ostrya carpinifolia*

Pendii esposti a Sud (essenze termofile)

Alto fino a 20m | Foglie ovate, appuntite, dentate, verde scuro | Corteccia grigia e liscia, marrone coll'età



Orniello *Fraxinus ornus*

Pendii esposti a Sud (essenze termofile)

Alto fino a 20m | Foglie pennate, molto dentate, verde opaco | Corteccia grigia e liscia



QUERCIA PUBESCENS

Foglie da ellittiche a obovate, lunghe fino a 10 cm e larghe fino a 5, con lobi arrotondati terminanti in un apice piccolo e appuntito, grigio-verde scuro nella pagina superiore, pelose in quella inferiore, con peluria soffice grigia da giovani poi quasi lisce su entrambe le pagine. **Corteccia** grigio scuro e solcata profondamente. **Fiori** maschili in amenti giallo-verdi, penduli, femminili insignificanti, portati separatamente sulla stessa pianta nella tarda primavera.

Frutti a ghianda, lunghi fino a 4 cm, per un terzo racchiusi in una cupola ricoperta con squame pelose.

- **ZONA D'ORIGINE:** Asia occidentale, Europa centrale e meridionale.
- **HABITAT** in luoghi aridi di collina.



• lobi della foglia arrotondati con apice acuminato

• piccoli fogliari pelosi

cupola della ghianda ricoperta con squame dense, pelose

pagina inferiore della foglia visibilmente pelosa



Roverella *Quercus pubescens*

Pendii esposti a Sud (essenze termofile)

Alto fino a 20m | Foglie da ellittiche a obovate, grigio-verde | Corteccia grigio scuro, solchi profondi



ABETE ROSSO

Foglie aghiformi, esili, rigide, lunghe 2 cm, verde scuro, su quattro lati del ramo, con apice acuminato, lasse alla base del ramo; rami lisci e marroni. **Corteccia** da rosso-marrone a grigia, si squama in sottili strisce. **Fiori** maschili rossi, gialli all'apertura, femminili rossi, in grappoli separati sulla stessa pianta in primavera. **Frutti** a cono cilindrico, marroni, penduli, lunghi fino a 15 cm.

- **ZONA D'ORIGINE:** Europa.
- **HABITAT** forestale-montuoso, su terreni umidi.
- **NOTA.** Questa importante specie ha molte varietà e cultivar. È largamente coltivata per il valore del suo legno.

fiori femminili si trasformano in coni



il fiore maschile cade dopo aver rilasciato il polline

foglie appuntite con quattro lati



squame del cono con cima tronca e dentellata


pagina inferiore della foglia



Abete rosso *Picea abies*

Versante alto Val Ravella (impianto artificiale '60 – '70)

Alto fino a 50m | Foglie aghiformi, esili, verde scuro | Corteccia da rosso marrone a grigia, si squama



Larice Europeo *Larix decidua*

Versante alto Val Ravella (impianto artificiale '60 – '70)


Alto fino a 40m | Foglie aghigormi, singole, verde lucente | Corteccia grigia, rosso-marrone, squamosa



Pino Himalayano (Pino excelsa) *Pinus wallichiana*

Versante alto Val Ravella (impianto artificiale '60 – '70)

Alto fino a 40m | Foglie aghigormi, esili, attorcigliate | Corteccia grigia e liscia, si scurisce e si fessura



Nocciolo *Corylus avellana*

Formazioni pioniere

Alto fino a 5m | Foglie alterne con margine dentato | Corteccia grigio-bruna lucida, fratture longitudinali



Betulla *Betula pendula*

Formazioni pioniere

Alto fino a 20m | Foglie alterne con margine dentato | Corteccia bianca, si sfalda in sottili lamelle



Salicone *Salix Caprea*

Formazioni pioniere

Alto fino a 15m | Foglie larghe color verde scuro | Corteccia giallo-marrone, col tempo scurisce



Peonia *Paeonia officinalis*
Praterie calcaree





Orchidea

Praterie calcaree



Genziane

Praterie calcaree



Citisio insubrico *Cytisus emeriflorus*
Praterie calcaree



© Flore-Alpe

Aglio di Lombardia *Allium insubricum*
Praterie calcaree

